

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
001	Consommation moyenne d'alcool pur par habitant de plus de 15 ans	P	IDA/INSEE	13,0l/an (2004)	12,3l/an (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Addictions
002	Prévalence déclarée des consommations excessives d'alcool dans l'année (18 ans ou plus)	P	ESPS (IRDES)	27%, typologie de risque non définie (2004)	33%, dont 24,9% à risque ponctuel et 8,5% chronique (2006)	Baromètre Santé	37% dont 28% à risque ponctuel et 9% risque chronique (2005)	ND	DREES (2008), DREES (2006), fiche de synthèse	Addictions
002	Prévalence déclarée des consommations à risque de dépendance (18 ans ou plus)	P	Baromètre Santé DETA	14% hommes 5% femmes (2005)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006), fiche de synthèse	Addictions
002	Nombre (et proportion) de conducteurs impliqués dans un accident corporel de la route avec un taux d'alcoolémie positif	P	ONISR	6844/129148, soit 5,3% des accidents corporels et 945/5737, soit 16,5% des accidents mortels (2003)	6,2% accidents corporels et 16,4% accidents mortels (2006)	ND	ND	ND	fiche de synthèse	Addictions
002	Prévalences des consommations régulières d'alcool et des ivresses répétées déclarées par les jeunes de 17 et 18 ans	Cp	ESCAPAD (OFDT)	14% de consommations régulières et 7% d'ivresses répétées (2003)	12% de consommations régulières et 9,7% d'ivresses répétées (2005) 8,9% de consommations régulières et 8,6% d'ivresses répétées (2008)	ND	ND	ND	DREES (2008), synthèses OFDT	Addictions
002	Nombre de décès, taux brut et taux standardisé de mortalité liée à l'imprégnation éthylique chronique	Cp	Cépi-DC	21998 (2000), taux non publiés	20000 (2005), taux non publiés	ND	ND	ND	DREES (2008), fiche de synthèse	Addictions
003	Prévalence des fumeurs quotidiens (18-74ans)	P	ESPS (IRDES)	fumeurs habituels: 33% des hommes et 23% des femmes (2006)	fumeurs habituels: 30% des hommes et 22% des femmes (2008)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2009), fiche de synthèse	Addictions
003	Prévalence du tabagisme quotidien chez les jeunes (15 ans, 16 ans, 17-18 ans)	P	ESCAPAD	40% des filles et 42% des garçons (2000)	28% des filles et 30% des garçons (2008)	ESPAD (OFDT)	24% des garçons et 21% des filles (2003)	18% des garçons et 16% des filles (2007)	DREES (2009), fiche de synthèse	Addictions
003	Prévalence du tabagisme quotidien au cours de la grossesse	P	Enquête Nationale Périnatale (ENP)	22% (2003)	ND	INPES	29% (2000)	21% (2005)	DREES 2009, fiche de synthèse	Addictions
003	Nombre de décès, taux brut et taux standardisé de mortalité par tumeur du larynx, trachée, bronches ou poumon	P	Cépi-DC	29300 (2005)	29765 (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), fiche de synthèse	Addictions

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>H</sup>	Thème
004	Proportion d'établissements scolaires où l'usage du tabac est effectivement prohibé ou qui limitent la consommation de tabac à des espaces réservés et convenablement ventilés	P	OFDT	interdiction totale dans les lycées: 14% pour les élèves ND pour les personnels (2002)	interdiction totale dans les lycées: 40% pour les élèves 11-18% pour les personnels (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006), fiche de synthèse	Addictions
004	Proportions de restaurants (et autres lieux de loisirs) de lieux de travail où l'usage du tabac est effectivement prohibé ou qui limitent la consommation de tabac à des espaces réservés et convenablement ventilés	P	DNF/TNS	Restaurants: 11% prohibé et 63% limité (2004); autres: ND	ND	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006), fiche de synthèse	Addictions
004	Pourcentage de personnes qui déclarent être exposées au tabac à domicile, en milieu professionnel, dans différents lieux de loisirs	Cp	INPES	Dom: ND; Pro: 53%; Hôtels: 45-50%; Restau: 73%; Cafés, bars: 91% Discothèques: 94% (dec 2006-jan 2007)	Dom: ND; Pro: 26%; Hôtels: 20%; Restau: 21%; cafés, bars: 38% discothèques: 39% (jan-juil 2008)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006), fiche de synthèse	Addictions
004	Pourcentage de jeunes (17-18 ans) qui déclarent fumer dans leur établissement scolaire	Cp	OFDT	ND	ND	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006), fiche de synthèse	Addictions
056	Nombre (et proportion) de nouveaux diagnostics d'infection à VIH chez des usagers de drogues injectables (UDI)	P	InVS (MDO)	197 soit 2,6% (2004)	128, soit 1,9% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006), fiche de synthèse	Addictions
056	Prévalence du VHC parmi les usagers de drogues (opiacés, cocaïne) âgés de moins de 25 ans ynt recours aux différentes structures de prise en charge	P	Enquête Coquelicot (InVS, ANRS)	10,2% (2004)	ND	PRELUD (OFDT)	18% (2003)	8% (2006)	DREES (2008), DREES (2006), fiche de synthèse	Addictions
058	Nombre de patients sous traitement de substitution et proportion de patients sous Méthadone	P	Indicateur composite GERS, SIAMOIS et InVS	104 767, dont 16,9% sous méthadone (2004)	109 954, dont 24,3% sous méthadone (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006), fiche de synthèse	Addictions
058	Proportion d'établissements pénitentiaires dans lesquels les traitements de substitution par la Méthadone sont accessibles	Cp	DGS/DHOS	74% (2004)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009)	Addictions
005	Prévalence de la surcharge pondérale (surpoids et obésité) en population adulte	P	ENNS	Hommes: 57,1% dont 16,1% obèses; Femmes: 41,4% dont 17,6% obèses (2006)	ND	ObEpi (TNS-SOFRES)	Hommes: 48,8% dont 11,4% obèses; Femmes: 35% dont 11,3% obèses (2003)	Hommes: 52,4% dont 13,9% obèses; Femmes: 41,1% dont 15,1% obèses (2009)	DREES (2009) Fiche de synthèse ObEpi Roche (2009)	Nutrition

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(?)</sup>	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>H</sup>	Thème
006	Concentration urinaire médiane en iode dans la population générale	P	ENNS	médiane 136 µg/l 20e perc 72 µg/l (2006)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009) Fiche de synthèse	Nutrition
006	Concentration urinaire médiane en iode des femmes enceintes	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Nutrition
006	Proportion de personnes hospitalisées pour pathologies thyroïdiennes non cancéreuses	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Nutrition
006	Apports en iode chez les nourrissons	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Nutrition
007	Prévalence de l'anémie ferriprive chez les enfants âgés de : 6 mois à 2 ans ; 2 à 4 ans	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Nutrition
007	Prévalence de l'anémie ferriprive chez les femmes de 15 à 49 ans	P	ENNS	3% (2006)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009)	Nutrition
007	Prévalence des insuffisances d'apports en fer	Cp	INCA-2	31,5%, dont 13% apports <0,5ANC (2006)	ND	ND	ND	ND		Nutrition
007	Proportion de femmes enceintes pour lesquelles il y a eu remboursement d'un hémogramme	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Nutrition
007	Proportion de femmes enceintes pour lesquelles il y a eu remboursement de supplémentation ferrique au cours de la grossesse	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Nutrition
008	Nombre (et taux) d'hospitalisations en MCO pour rachitisme carentiel	P	PMSI	35, soit taux brut 0,18*10 <sup>-5</sup> jours d'hospitalisation et taux standardisé 0,18*10 <sup>-5</sup> (2004)	37, soit taux brut 0,19*10 <sup>-5</sup> jours d'hospitalisation et taux standardisé 0,20*10 <sup>-5</sup> (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DRESS (2007), DREES (2006)	Nutrition
009	Proportion de personnes interrogées qui déclarent comme activité physique au moins l'équivalent de 30 minutes de marche rapide par jour	P	ENNS	63 % (2006)	ND	Baromètre Santé (2005) Baromètre santé nutrition (2008)	79 % (2005)	67% (2008)	DREES (2008)	Nutrition
009	Proportion de personnes interrogées qui déclarent avoir pratiqué une activité physique la veille (marche à pied ou activité sportive)	Cp	Baromètre Santé	81% (2005)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Nutrition

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (?): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

µ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
010	Proportion de personnes déclarant consommer moins de 3,5 portions de fruits ou légumes par jour	P	ENNS	Adultes: 35% (2006)	ND	INCA-2	adultes: 33,7%	ND	Rapport thématique	Nutrition
010	Proportions de personnes déclarant avoir consommé moins de 5, et moins de 3, portions de fruits ou légumes la veille	Cp	Baromètre Santé-nutrition	Moins de 5 Hommes: 92,3%, Femmes: 87,3%; Moins de 3 Hommes: 80,9%, Femmes: 71,2% (2002)	Moins de 5 Hommes: 89,3%, Femmes: 87,0%; (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Nutrition
010	Achats de fruits et légumes par an et par personne	Cp	Comptabilité Nationale	62,1Kg (2003)	63,1Kg (2007)	ND	ND	ND	DRESS (2009), DREES (2006)	Nutrition
011	Consommation de sel moyenne dans la population	P	INCA	8,1g/j (1999)	7,5 g/j (2007)	ENNS	8,4g/j (2006)	ND	DREES (2009)	Nutrition
012	Prévalences de la surcharge pondérale et de l'obésité en grande section de maternelle	P	Enquête en milieu scolaire (Education Nationale)	14,4% en surcharge et 3,9% d'obésité (2000)	12,1% en surcharge et 3,1% d'obésité (2006)	ENNS	18% surcharge et 3% obésité entre 3 et 17 ans (2006)	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Nutrition
012	Prévalences de la surcharge pondérale et de l'obésité en CM2	P	Enquête Santé des élèves (Education Nationale)	19,9% en surcharge, dont 4,1% d'obèses (2001-02)	19,7% en surcharge dont 3,7% d'obèses (2004-05)				DREES (2008), DREES (2006)	Nutrition
012	Prévalences de la surcharge pondérale et de l'obésité des élèves de troisième	P	Enquête Santé des élèves (Education Nationale)	15,7% en surcharge dont 3,3% d'obèses (2000-2001)	16,8% en surcharge dont 4,4% d'obèses (2004)				DREES (2008), DREES (2006)	Nutrition
012	Prévalences de la surcharge pondérale, du surpoids et de l'obésité des adolescents de 17 ans	Cp	ESCAPAD (OFDT)	5,8% en surcharge, dont 1,1% d'obèses (2003)	ND				DREES (2008), DREES (2006)	Nutrition
012	Prévalences de la surcharge pondérale, du surpoids et de l'obésité en CE1 et CE2	Cp	Enquête Santé des élèves (Education Nationale)	18,1% en surcharge dont 3,8% obèses (2000)	18,4% de surcharge dont 3,8% obèses (2007)				DREES (2008), DREES (2006)	Nutrition

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valuer B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
013	<i>Incidence des anomalies de fermeture du tube neural</i>	P	Données groupées des registres de malformations congénitales	10,2AFTN/10000 naissances ou ITG (2002-2006)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Nutrition
013	<i>Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans pour lesquelles les apports en folates sont inférieurs aux ANC</i>	Cp	INCA-2	75% <100% des ANC 29<2/3 ANC 8%<50%ANC (2007)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Nutrition
013	<i>Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans pour lesquelles les folates sanguins sont inférieurs aux valeurs normales</i>	Cp	ENNS	6,8% des 18-74 ans non ménopausées, soit 8,0% 18-39 ans et 5,4% >40 ans non ménopausées (2006)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Nutrition
013	<i>Proportion de femmes enceintes ayant eu un traitement par folates</i>	Cp	Medicam	20% (2007)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009)	Nutrition
098	<i>Distribution des taux d'albumine sérique chez les personnes de 70 à 75 ans vivant à domicile</i>	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Nutrition
098	<i>Distribution des taux d'albumine sérique chez les personnes de 75 ans et plus vivant en institution</i>	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Nutrition
098	<i>Prévalence de la maigreur pathologique chez les personnes de 70 à 75 ans vivant à domicile</i>	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Nutrition
098	<i>Prévalence de la maigreur pathologique chez les personnes de 75 ans et plus vivant en institution</i>	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Nutrition
014	<i>Nombre d'accidents routiers mortels liés au travail (accidents de mission et accidents du trajet)</i>	P	CNAMTS et CMSA	Mission: 212, Trajet 497 (2003)	Mission: 149, Trajet: 377 (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2007), fiche de synthèse	Santé-Travail-Environnement
015	<i>Pourcentage de travailleurs exposés à des contraintes articulaires plus de 20 heures par semaine</i>	P	SUMER	6,6% (2003)	ND	ND	ND	ND	DREES (2007)	Santé-Travail-Environnement
015	<i>Pourcentage de travailleurs déclarant être exposés à des postures pénibles ou fatigantes à la longue durant le travail</i>	Cp	Enquête Conditions de Travail (DARES/INSEE)	37% (1998)	34% (2005)	ND	ND	ND	DREES (2008), (DREES 2006)	Santé-Travail-Environnement
015	<i>Incidence des syndromes du canal carpien attribuables à une activité professionnelle</i>	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé-Travail-Environnement

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(?)</sup>	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee1)	Valuer B <sup>(?)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>H</sup>	Thème
016	Pourcentage de travailleurs exposés à un bruit de niveau d'exposition sonore supérieur à 85 décibels plus de 20 heures par semaine	P	SUMER	5,9% (2003)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
016	Pourcentage de travailleurs déclarant être exposés à un bruit intense en milieu professionnel	Cp	Enquête Conditions de Travail (DARES/INSEE)	3,5% (1998)	3,3% (2005)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
017	Pourcentage de personnes exposées aux agents cancérigènes (cat 1 et 2) par branche professionnelle et par type de substance pour les 7 principales substances cancérigènes.	P	SUMER	6,3% (2003)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
018	Proportion d'enfants de 1 à 6 ans ayant une plombémie > 100 µg/l en population générale	P	INSERM (RNSP)	2% (1995)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
018	Nombre d'enfants dépistés pour le saturnisme par région, par ville	Cp	SNSPE	10672 (2003)	11534 (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
018	Proportion d'enfants ayant une plombémie supérieure à 100 µg/l parmi les enfants dépistés	Cp	SNSPE	6,7% (2003)	3,7% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Santé-Travail-Environnement
018	Distribution des sources d'exposition : Habitat ancien dégradé ; Pollutions industrielles	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé-Travail-Environnement
019	Pourcentage d'établissements scolaires et médico-sociaux ayant des taux de radon supérieurs à 400 Bq/m <sup>3</sup> parmi ceux des 31 départements considérés comme « prioritaires »	P	DGS/DDASS	11,4% (2000)	21% (2008)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
019	Taux de couverture du programme de détection : pourcentage d'établissements où les mesures de radon ont été faites dans un programme de détection parmi les établissements du département	Cp	DGS/DDASS	1 département était exhaustif (Haute-Vienne) (2000)	En cours	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
019	Impact du traitement sur les établissements : pourcentage d'établissements dont les taux de radon sont descendus au dessous des valeurs seuils parmi ceux qui ont été détectés avec des valeurs supérieures au seuil	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé-Travail-Environnement
020	Concentrations moyennes annuelles en particules PM10 dans l'air ambiant	P	ADEME-BDQA	20µg/m <sup>3</sup> (2004)	23µg/m <sup>3</sup> (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Santé-Travail-Environnement

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (?): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

µ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>H</sup>	Thème
020	Concentrations moyennes annuelles en particules NO <sub>x</sub> dans l'air ambiant	P	ADEME-BDQA	25µg/m3 (2004)	22µg/m3 (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Santé-Travail-Environnement
020	Concentrations moyennes annuelles en particules SO <sub>2</sub> dans l'air ambiant	P	ADEME-BDQA	4µg/m3 (2004)	2,2µg/m3 (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Santé-Travail-Environnement
020	Concentrations moyennes annuelles en particules O <sub>3</sub> dans l'air ambiant	P	ADEME-BDQA	rurales nationales: 68,1 rurales régionales: 61,6 stations urbaines: 47,6 µg/m3 (2004)	rurales nationales: 66,5 rurales régionales: 60,0 stations urbaines: 48,1 µg/m3 (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Santé-Travail-Environnement
020	Fréquence de dépassement des seuils légaux pour le NO <sub>2</sub>	P	AASQA/MED D	Seuil d'information: 6; Seuil d'alerte: 0 (2005)	Seuil d'information: 11; Seuil d'alerte: 0 (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
020	Fréquence de dépassement des seuils légaux pour le SO <sub>2</sub>	P	AASQA/MED D	Seuil d'information: 55; Seuil d'alerte: 6 (2005)	Seuil d'information: 35; Seuil d'alerte: 0 (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
020	Fréquence de dépassement des seuils légaux pour l'O <sub>3</sub>	P	AASQA/MED D	Seuil d'information: 337; Seuil d'alerte: 3 (2005)	Seuil d'information: 36; Seuil d'alerte: 0 (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
020	Nombre de personnes exposées à des dépassements des seuils réglementaires pour les polluants majeurs (NO <sub>2</sub> et O <sub>3</sub> )	P	ADEME-IFEN	Pour O <sub>3</sub> : entre 13 et 15,6 millions en (2004)	ND	ND	ND	ND		Santé-Travail-Environnement
020	Évaluation de l'impact sanitaire à court terme dans les villes de plus de 100 000 habitants où les niveaux d'exposition aux polluants atmosphériques sont mesurés	P	PSAS (InVS)	Pour tous les polluants 2786 décès au total dont 1097 décès par cause Cardio-vasculaire et 316 décès par cause respiratoire évitables sur la période, liés à un effet de court terme (1990- 1997)	1500 décès évitables chez les 30 ans et plus, liés à l'exposition chronique aux PM <sub>2,5</sub> (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
021	Concentrations moyennes annuelles en benzène et métaux lourds (plomb, cadmium, arsenic, nickel) dans l'air ambiant	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé-Travail-Environnement
021	Agglomérations >250 000 habitants touchées par des dépassements de valeurs cibles pour des métaux toxiques (plomb) et des dépassements des valeurs réglementaires en benzène	P	CITEPA	0 (2007)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Santé-Travail-Environnement

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

µ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
021	Nombre de personnes exposées à des dépassements des valeurs cibles pour les métaux lourds et des dépassements des valeurs réglementaires pour le benzène dans les agglomérations supérieures à 250 000 habitants	P	CITEPA	0 (2007)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Santé-Travail-Environnement
021	Émission totale et sectorielles de Benzène	P	CITEPA	66,3 kT dont 75% secteur résidentiel tertiaire, 17% transport routier. (2004)	54,9 kT, dont 75% secteur résidentiel tertiaire, 15% transport routier. (2006)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Santé-Travail-Environnement
021	Émission totale et sectorielles de Chlorures de vinyle	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Santé-Travail-Environnement
021	Émission totale et sectorielles de Dioxines	P	CITEPA	300gITEQ (2004)	127gITEQ, dont 33% par le traitement des déchets et 33% dans la métallurgie (2006).	ND	ND	ND	DREES (2008)	Santé-Travail-Environnement
021	Émission totale et sectorielles de plomb	P	CITEPA	142T (2004)	127T, dont 66% par l'industrie manufacturière (2006)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Santé-Travail-Environnement
021	Émission totale et sectorielles de cadmium	P	CITEPA	6,7T (2004)	4,6T, dont 76% par l'industrie manufacturière (2006)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Santé-Travail-Environnement
021	Émission totale et sectorielles de mercure	P	CITEPA	8,6T (2004)	7,9T, principalement par la production d'énergie et l'industrie manufacturière (2006)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Santé-Travail-Environnement
022	Proportion de la population alimentée par de l'eau non conforme pour les paramètres microbiologiques	P	SISE-Eaux	5% (2004)	3,8% (2008)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
022	Proportion de la population alimentée par de l'eau non conforme pour les pesticides	P	SISE-Eaux	6,8% (2004)	8,1% (2008)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
023	Nombre de décès, taux brut et taux standardisé de mortalité par intoxication au monoxyde de carbone	P	Cépi-Dc	77 décès; taux brut: 0,13/1000hab, taux standardisé: 0,11/100000hab. (2002)	85 décès; taux brut: 0,14/1000hab, taux standardisé: 0,12/100000hab. (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
024	Pas d'indicateur défini									Santé-Travail-Environnement
025	Nombre de nouveaux cas de légionelloses ayant fait l'objet d'une déclaration obligatoire	P	InVS (MDO)	1527, soit 2,5 cas/100.000hab (2005)	1244, soit 2,0 cas/100.000hab (2008)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
025	Nombre de décès, taux brut et taux standardisé de mortalité par légionellose	Cp	Cépi-Dc	65 décès (2002)	101 décès (2005)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres



N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>H</sup>	Thème
025	Qualité de l'eau et présence de légionelles dans les domiciles privés	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Santé-Travail-Environnement
094	Taux de mortalité à 30 jours après accident de la route	P	ONISR	Métropole: 87*10 <sup>-6</sup> Hab; DOM: 122*10 <sup>-6</sup> Hab (2005)	Métropole: 68,8*10 <sup>-6</sup> Hab; DOM: 91,8*10 <sup>-6</sup> Hab (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Traumatismes, violence routière
094	Taux de mortalité après accident de la route	Cp	Cépi-Dc	ND; Nombre de décès: 7200 (2002)	ND; Nombre de décès: 4708 (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Traumatismes, violence routière
094	Taux d'hospitalisation de 6 jours ou plus après un accident de la route	Cp	ONISR	16% des blessés ; Nombre: 17435 (2004)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Traumatismes, violence routière
094	Fréquence des traumatismes responsables d'au moins une lésion IIS >= 3 (séquelles graves)	Cp	Registre du Rhône	taux 51*10 <sup>-6</sup> Hab (1995-2002)	Taux: 53*10 <sup>-6</sup> Hab; (2002-2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Traumatismes, violence routière
026	Densité d'incidence par jour d'hospitalisation des événements indésirables graves liés aux soins observés dans les établissements de santé	P	ENEIS	6,6*10 <sup>-3</sup> journées d'hospitalisation, dont 4,4*10 <sup>-3</sup> pour acte invasif, 1,87*10 <sup>-3</sup> due aux produits de santé et 1,6*10 <sup>-3</sup> en rapport avec des infections. (2004)	ND	ND	ND	ND	DREES (2007), DREES (2006), fiche de synthèse	Risques liés aux soins
026	Incidence des infections du site opératoire	P	ISO-RAISIN	1,46/100 patients opérés (1999-2005)	1,16/100 patients opérés (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2007), DREES (2006), fiche de synthèse	Risques liés aux soins
026	Densité d'incidence des bactériémies nosocomiales / 1000 Journées en hospitalisation complète	P	BN-RAISIN	0,45*10 <sup>-3</sup> journées d'hospitalisation (2004)	0,45*10 <sup>-3</sup> journées d'hospitalisation (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2007), DREES (2006), fiche de synthèse	Risques liés aux soins
026	Prévalence des infections nosocomiales parmi les personnes hospitalisées un jour donné	P	BN-RAISIN	4,61% (2001)	4,25% (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2007), DREES (2006), fiche de synthèse	Risques liés aux soins
026	Nombres et taux de décès - par infections nosocomiales - dans les GHM à faibles taux de mortalité	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Risques liés aux soins

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>H</sup>	Thème
027	Fréquence et proportion des admissions hospitalières pour effets indésirables graves médicamenteux	P	CRPV	spécialités médicales: 3,19% (1998)	spécialités médicales: 3,6% (2007)	ENEIS	médecine+ chirurgie: 1,6% médecine 2,75% (2004)	ND	DREES (2008), fiche de synthèse	Risques liés aux soins
027	Nombre et pourcentage de feuilles de soins comportant une association médicamenteuse formellement contre-indiquée	Cp	ENEIS	Nombre: ND; 1,9/1000 ordonnances	ND	ND	ND	ND	fiche de synthèse	Risques liés aux soins
027	Données des déclarations, des vigilances, assurantielles	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Risques liés aux soins
027	Nombre et taux de décès ayant la iatrogénie médicamenteuse comme cause principale	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Risques liés aux soins
028	Densité d'incidence des EIG évitables liés aux soins en cours d'hospitalisation	P	ENEIS	2,3/1000 journées d'hospitalisation, actes invasifs:1,4/1000 journées, médicaments 0,5/1000 (2004)	ND	ND	ND	ND		Risques liés aux soins
028	Proportion d'évènements évitables parmi les EIG liés aux soins en cours d'hospitalisation	P	ENEIS	35,9% (2004)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Risques liés aux soins
028	Proportion d'hospitalisations causées par un EIG évitable parmi les hospitalisations causées par un EIG lié aux soins ;	P	ENEIS	46,4% (2004)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Risques liés aux soins
028	Données de déclaration, de vigilance, assurantielles	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Risques liés aux soins
028	Taux de décès ayant la iatrogénie comme cause	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Risques liés aux soins
029	Pas d'indicateur défini									Risques liés aux soins
100	Pas d'indicateur défini									Risques liés aux soins
030	Taux d'incidence des infections à S.ARM pour 1000 journées d'hospitalisation et taux d'attaque pour 100 hospitalisations MCO	P	BMR-RAISIN	Densité d'incidence: 0,72/1000JH (2003)	Densité d'incidence: 0,54/1000JH (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), fiche de synthèse	Maladies Infectieuses
030	Taux d'incidence des infections communautaires graves (méningites, bactériémies) à pneumocoques résistants	P	BMR-RAISIN	5,2*10 <sup>-6</sup> Hab (2003)	4,2*10 <sup>-6</sup> Hab (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies Infectieuses
030	Proportion de souches de S. Pneumoniae ayant une sensibilité diminuée à la pénicilline G et proportions de souches résistantes à la pénicilline G, l'érythromycine, les fluoroquinolones	Cp	CNR Pneumocoques	Pénicilline (I+R): 42,9%; érythromycine (I+R): 47,4%; Fluoroquinolones (I+R): 1,7% (2003)	Pénicilline (I+R): 31,9%; érythromycine (I+R): 34,9%; Fluoroquinolones (I+R): 1,5% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies Infectieuses

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>H</sup>	Thème
030	Proportion de souches hospitalières de <i>S. aureus</i> résistantes à la pénicilline	Cp	BMR-RAISIN	28,7% (2004)	26,0% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), fiche de synthèse	Maladies Infectieuses
030	Prévalence des infections à <i>S.ARM</i> parmi les personnes hospitalisées un jour donné	Cp	Enquêtes Nationales de Prévalence	0,49% (2001)	0,29% (2006)	Enquête nationale tous étbts	0,39/100 patients (2006)	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
030	Consommations d'antibiotiques en santé humaine : Ventes (DDD par jour pour 1 000 habitants)	Cp	Afssaps	28,9doses /1000Hab/j (2003)	28,6doses /1000Hab/j (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies Infectieuses
030	Consommations d'antibiotiques en santé humaine : prescriptions communautaires	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Maladies Infectieuses
036	Incidence cumulée des cas déclarés de sida	P	InVS (MDO)	2,5*10 <sup>-5</sup> (2004)	2,0*10 <sup>-5</sup> (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies Infectieuses
036	Incidence des nouveaux diagnostics déclarés d'infection à VIH chez l'adulte	P	InVS (MDO)	Nombre: 7000 (2004)	Nombre: 6500, soit 103 cas*10 <sup>-6</sup> Hab (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies Infectieuses
036	Proportion de personnes diagnostiquées au stade sida non dépistées auparavant	Cp	InVS (MDO)	45% (2004)	51% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies Infectieuses
036	Proportion de personnes diagnostiquées au stade sida non traitées auparavant (séropositivité connue)	Cp	InVS (MDO)	54% (2004)	60% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies Infectieuses
036	Proportion d'infections récentes (≤ 6 mois) parmi les infections à VIH	Cp	InVS (MDO)	23% (2004)	29% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies Infectieuses
037	Nombre et taux de décès associés à une hépatite chronique par le VHC	P	Cépi-DC	Associés 3618, soit 6,1*10 <sup>-5</sup> Hab; Imputables 2646, soit 4,5*10 <sup>-5</sup> Hab (2001)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
037	Nombre et taux de décès associés à une hépatite chronique par le VHB	P	Cépi-DC	Associés 1507, soit 2,6*10 <sup>-5</sup> Hab; Imputables 1327, soit 2,2*10 <sup>-5</sup> Hab (2001)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
037	Nombre de patients admis en ALD n° 6 pour hépatite chronique B ou C	Cp	Données ALD des 3 régimes AM	12302 (2004)	11706 (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
038	Incidence cumulée des cas déclarés de tuberculose	P	InVS (MDO)	9,2*10 <sup>-5</sup> Hab (2004)	8,9*10 <sup>-5</sup> Hab (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies Infectieuses
038	Nombre et incidence cumulée de patients nouvellement admis en ALD n°29 pour tuberculose active	Cp	Données ALD des 3 régimes AM	Nb: 5566, incidence non publiée (2003)	Nb: 4623, incidence non publiée (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
038	Nombre et incidence cumulée de patients ayant été remboursés pour traitement anti-tuberculeux pendant une durée minimale	Cp	CNAMTS	6471, soit 14,8*10 <sup>-5</sup> Hab (2003)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Maladies Infectieuses

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>H</sup>	Thème
039	Taux de vaccination contre la grippe des personnes âgées de 65 ans ou plus	P	CNAMTS	64% (2004-05)	64% (2007-08)	TNS-SOFRES	68% (2004-05)	69% (2007-2008)	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies Infectieuses
039	Taux de vaccination contre la grippe des personnes de moins de 65 ans ayant une des ALD donnant lieu à une prise en charge à 100% de la vaccination	P	CNAMTS	50,8% (2004-05)	48,4% (2007-08)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
039	Proportion de professionnels du secteur sanitaire ou social déclarant avoir été vaccinés contre la grippe dans l'année	Cp	TNS-SOFRES	MG:66%, IDE:31%, Maisons de retraite: 38%, Urgences: 29% (2004-05)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
040	Taux de mortalité par maladies infectieuses intestinales	P	Cépi-Dc	<1an: 2,9*10 <sup>-5</sup> Hab; 65-74ans: 2,6*10 <sup>-5</sup> Hab; 75-84ans: 7,3*10 <sup>-5</sup> Hab; >85ans: 36,8*10 <sup>-5</sup> Hab (2004)	<1an: 2,2*10 <sup>-5</sup> Hab; 65-74ans: 1,8*10 <sup>-5</sup> Hab; 75-84ans: 7,3*10 <sup>-5</sup> Hab; >85ans: 31,8*10 <sup>-5</sup> Hab (2006)	Rapport de définition des indicateurs de suivi de l'atteinte des objectifs	<1an: 3,4*10 <sup>-5</sup> Hab; 65-74ans: 1,65*10 <sup>-5</sup> Hab; 75-84ans: 6,8*10 <sup>-5</sup> Hab; 85-94ans: 25,1,8*10 <sup>-5</sup> Hab et >102,9*10 <sup>-5</sup> Hab	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
041	Nombre moyen de gonocoques isolés par an et par laboratoire actif au sein du réseau de laboratoires volontaires RENAGO	Cp	InVS	2,48 (2004)	3,3 (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
041	Nombre de personnes ayant un diagnostic de syphilis récente (syphilis primaire, secondaire ou latente précoce) dans les centres volontaires de référence	Cp	InVS	402 (2004)	599 (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
041	Nombre de boîtes d'Extencilline (2,4 MU) vendues	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Maladies Infectieuses
041	Nombre annuel de diagnostics microbiologiques d'infection à chlamydiae trachomatis au sein du réseau de laboratoires volontaires RENACHLA	Cp	InVS	Hommes: 12/laboratoire/an; Femmes: 23/laboratoire/an (2004)	Hommes: 17/laboratoire/an; Femmes: 34/laboratoire/an (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Infectieuses
041	Prévalence des sérologies positives à HSV1 et HSV 2	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Maladies Infectieuses
042	Couverture vaccinale des enfants de 24 mois : Diphtérie tétanos poliomyélite	P	CS24 (DREES)	DT: 90,0%; Polyo: 89,9% (2004)	DTCP>95% (2005)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Infectieuses
042	Couverture vaccinale des enfants de 24 mois : Coqueluche	P	CS24 (DREES)	89,6% (2004)		ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Infectieuses
042	Couverture vaccinale des enfants de 24 mois : Hémostophilus influenzae b	P	CS24 (DREES)	87,0% (2004)	85% (2005)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Infectieuses
042	Couverture vaccinale des enfants de 24 mois : Hépatite B (3 injections)	P	CS24 (DREES)	29,0% (2004)	35,1% (2005)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Infectieuses

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
042	Couverture BCG chez enfants 2-7 mois		CS24 (DREES)		45%(2008)				DREES (2009)	
042	Couverture vaccinale des enfants de 24 mois : ROR	P	CS24 (DREES)	Rougeole: 87,0%; Oreillons: 86,8%; Rubéole: 86,8% (2004)	Rougeole: 87,2%; Oreillons: 87,0%; Rubéole: 87,0% (2005)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
042	Couverture vaccinale des enfants de 5-6 ans : BCG	P	Enquêtes triennales santé des élèves (éducation nationale)	99% (2002)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Maladies Infectieuses
042	Couverture vaccinale des enfants de 5-6 ans : ROR	P	Enquêtes triennales santé des élèves (éducation nationale)	95% (2002)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Maladies Infectieuses
042	Couverture vaccinale des adolescents : Vaccination DT poliomylélite des élèves de troisième à jour (6 doses)	P	Enquêtes triennales santé des élèves (éducation nationale)	80,5% (2003-04)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Infectieuses
042	Couverture vaccinale des adolescents : Vaccination coqueluche des élèves de troisième à jour (5 doses)	P	Enquêtes triennales santé des élèves (éducation nationale)	57,4% (2003-04)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Infectieuses
042	Couverture vaccinale des adolescents : Vaccination ROR des élèves de troisième (2 doses)	P	Enquêtes triennales santé des élèves (éducation nationale)	Rougeole: 65,7%; Oreillons: 61,1%; Rubéole: 65,5% (2003-04)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Infectieuses
042	Couverture vaccinale des adolescents : Vaccination hépatite B complète des élèves de troisième	P	Enquêtes triennales santé des élèves (éducation nationale)	42,4% (2003-04)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Infectieuses

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B (1)	Valeur B (1) (annee1)	Valeur B (1) (annee2)	Documents de référence <sup>H</sup>	Thème
042	Conversion vaccinale déclarée par les adultes : Rappel tétanos au cours des dix dernières années	P	ESPS (IRDES)	69% (2002)	62,3% (?)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
042	Conversion vaccinale déclarée par les adultes : Rappel poliomyélite au cours des dix dernières années	P	ESPS (IRDES)	53% (2002)	36,1% (?)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
042	Conversion vaccinale (polio et tétanos) des adultes examinés en consultation de prévention	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Maladies Infectieuses
042	Ventes des différents vaccins aux officines, dispensaires et hôpitaux	Cp	GERS	Variation 2004-2008: BCG: -78%; DTCP (enfant): +5%; HiB: +20%; Pneumocoque heptavalent: +88%; HepB (enfant): +82%; Oreillons: +7%; Rougeole: +7%; Rubéole: +6%; DTP (enfant): -10%; dTP (adulte): -25%; dTcaP (adulte): +275%		ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies Infectieuses
043	Pas d'indicateur défini				ND					Maladies Infectieuses
054	Proportions de personnes diabétiques ayant eu dans l'année au moins trois remboursements pour dosage de l'hémoglobine glyquée ( et au moins 2)	P	ENTRED estimation basse (données de remboursement uniquement) / ERASME estimation basse (données CNAMTS)	≥3: 29,9 / 36,1%; ≥2: 52,5 / 56,2% (2001)	≥3: 38,4 / 46,1%; ≥2: 64,6 / 69,3% (2007)		≥3: 36,2%; ≥2: 60,6% (2005)	≥3: 36,8%; ≥2: 61,7% (2006)	DREES (2008)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
054	Proportions de personnes diabétiques ayant eu dans l'année au moins un remboursement pour dosage du cholestérol (ou bilan lipidique)	P		62,2 / 69,4% (2001)	70,8 / 75,2% (2007)		67,2% (2005)	68,1% (2006)	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
054	Proportions de personnes diabétiques ayant eu dans l'année au moins un remboursement pour dosage de la créatininémie	P		71,3 / 77,6% (2001)	79,7 / 82% (2007)		75,0% (2005)	76,8% (2006)	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
054	Proportions de personnes diabétiques ayant eu dans l'année au moins un remboursement pour dosage de microalbuminurie	P		17,7 / 31,7% (2001)	26,0 / 35,8% (2007)		24,7% (2005)	25,6% (2006)	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
054	Proportions de personnes diabétiques ayant eu dans l'année au moins un remboursement d'ECCG (ou consultation de cardiologie)	P	haute (incluant séjours hospitaliers)	29,8 / 44,9% (2001)	34,4 / 41,9% (2007)		32,8% (2005)	33,7% (2006)	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
054	Proportions de personnes diabétiques ayant eu dans l'année au moins un remboursement pour dosage des triglycérides (ou bilan lipidique)	P		62,0 / 69,1% (2001)	71,1 / 75,5% (2007)		67,4% (2005)	68,4% (2006)	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
054	Proportions de personnes diabétiques ayant eu dans l'année au moins un remboursement de consultation ophtalmologique (ou rétinographie)	P		43,0 / 52,5% (2001)	44,1 / 51,0% (2007)		43,3% (2005)	43,7% (2006)	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
054	Prévalence du diabète	Cp	CNAMTS	Diabète traité (médicaments ou insuline): 2,7% (France Métropolitaine 2000)	3,6% France Métro (2005) ; France entière : 3,95% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
055	Prévalence et incidence de cécité chez les personnes présentant un diabète	P	ENTRED	Prévalence (selon): Patients: ND, Médecins: 1,4%; Incidence (selon): Patients: ND, Médecins: 0,3% (2001)	Prévalence (selon): Patients: ND, Médecins: 0,4%; Incidence (selon): Patients: ND, Médecins: 0,1% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
055	Prévalence et incidence d'infarctus du myocarde chez les personnes présentant un diabète	P	ENTRED	IDM ou angor: Prévalence (selon): Patients: 15,3%, Médecins: ND; Incidence (selon): Patients: 1,9%, Médecins: 0,8 (2001)	IDM ou angor ou revascularisation coronaire : Prévalence (selon): Patients: 20,0%, Médecins: 16,5%; Incidence (selon): Patients: ND, Médecins: 4,0% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
055	Prévalence et incidence d'amputations chez les personnes présentant un diabète	P	ENTRED	Membre inférieur uniquement: Prévalence (selon): Patients: 1,4%, Médecins: 1,0%; Incidence (selon): Patients: 0,3%, Médecins: 0,2% (2001)	Membre inférieur uniquement: Prévalence (selon): Patients: 1,5%, Médecins: 0,8%; Incidence (selon): Patients: ND, Médecins: 0,4% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
055	<i>Prévalence et incidence de l'insuffisance rénale chronique chez les personnes présentant un diabète</i>	P	ENTRED	IRC: ND; Dialyse ou greffe rénale: Prévalence (selon): Patients: 0,5%, Médecins: 0,5%; Incidence (selon): Patients: 0,2%, Médecins: 0,1% (2001)	IRC: ND; Dialyse ou greffe rénale: Prévalence (selon): Patients: 0,3%, Médecins: 0,3%; Incidence (selon): Patients: ND, Médecins: 0,1% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
055	<i>Prévalence et incidence du mal perforant plantaire chez les personnes présentant un diabète</i>	P	ENTRED	Prévalence (selon): Patients: 6,0%, Médecins: 1,5%; Incidence (selon): Patients: 2,7%, Médecins: 0,6% (2001)	Prévalence (selon): Patients: 10,1%, Médecins: 2,3%; Incidence (selon): Patients: ND, Médecins: 0,9% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
055	<i>Hospitalisations de personnes diabétiques pour amputation</i>	P	PMSI	Personnes: 7955, Tx brut: $378 \times 10^{-5}$ diabétiques; tx standardisé: $139 \times 10^{-5}$ diabétiques; Séjours: 9508 (2003)	Personnes: 9 236, Tx brut: $376 \times 10^{-5}$ diabétiques; tx standardisé: $136 \times 10^{-5}$ diabétiques; Séjours: 11 442 (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
055	<i>Hospitalisations de personnes diabétiques pour infarctus du myocarde</i>	P	ND	ND	Personnes: 12600, Tx brut: $512 \times 10^{-5}$ diabétiques; tx standardisé: $208 \times 10^{-5}$ diabétiques; Séjours: 1166 (2006)	ND	ND	ND	DREES 2009	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
055	<i>Hospitalisations de personnes diabétiques pour plaie du pied</i>	P	PMSI	Séjours: 18900, Tx brut: $30,6 \times 10^{-5}$ Hab, Tx standardisé: $25,5 \times 10^{-5}$ Hab (2003)	Séjours: 24 700 Tx brut: $38,8 \times 10^{-5}$ Hab, Tx standardisé: $29,9 \times 10^{-5}$ Hab (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
055	<i>Nombre de patients diabétiques entrant en insuffisance rénale chronique terminale</i>	P	REIN	1507 pour les 13 régions couvertes; estimation France entière: 2670; Tx incidence brute IRCT+diabète : 44 / 1 million pers (2005)	2217 pour les 16 régions couvertes; estimation France entière: 2900; Tx incidence brute IRCT+diabète : 47 / 1 million pers (2006)	ENTRED	Selon patients: $200 \times 10^{-5}$ diabétiques; selon médecins: $120 \times 10^{-5}$ diabétiques (2001)	ND	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres



N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
055	<i>Nombres et taux de décès ayant pour cause un diabète et âge moyen au décès</i>	Cp	Cépi-Dc	Nombre: 29 357 (causes multiples) et 11 203 (cause initiale), Tx brut et standardisé pour causes multiples: 49,2*10 <sup>-5</sup> Hab, 31,7*10 <sup>-5</sup> Hab, âge moyen: 78 ans (2002)	Nombre: 32 156 (causes multiples) et 11 498 (cause initiale), Tx brut et standardisé pour causes multiples: 50,7*10 <sup>-5</sup> Hab, 30,8*10 <sup>-5</sup> Hab, âge moyen: 78 ans (2006)	ND	ND	ND	DREES (2007 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
055	<i>Traitement laser ophtalmologique</i>	Cp	ENTRED	entre 90000-290000/2millions personnes diabétiques traitées (2001)	17,2% selon les patients 4,6% selon les médecins (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008 et 2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
069	<i>Nombre de décès, taux brut et taux standardisé de mortalité par cardiopathie ischémique</i>	P	Cépi-Dc	Hommes: Nombre: 24256, tx standardisé: 69,9/10 <sup>-5</sup> Hab; Femmes: Nombre: 19321, tx standardisé 28,3*10 <sup>-5</sup> Hab (2002)	Hommes: Nombre: 22 012, tx standardisé: 57,1/10 <sup>-5</sup> Hab; Femmes: Nombre: 16 794, tx standardisé 22,4*10 <sup>-5</sup> Hab (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
069	<i>Nombre de décès, taux brut et taux standardisé de mortalité par thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire (diagnostic initial ou associé)</i>	P	Cépi-Dc	Nombre: 5757, taux standardisé: 6,0*10 <sup>-5</sup> Hab (2002)	Nombre: 5 065 décès taux standardisé: 4,9*10 <sup>-5</sup> (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
069	<i>Taux d'incidence national annuel (estimé) des cardiopathies ischémiques</i>	Cp	MONICA 1996 / MONA LISA 2006	ND	ND	ND	ND	ND		Maladies cardiovasculaires et métaboliques
069	<i>Nombre et taux de séjours hospitaliers en MCO pour cardiopathie ischémique</i>	Cp	PMSI	Séjours: 315800, taux brut: 507,2*10 <sup>-5</sup> Hab; Personnes: 215570, taux brut 345,2*10 <sup>-5</sup> Hab (2004)	Séjours: 319900, taux brut: 506,3*10 <sup>-5</sup> Hab; Personnes: 221373, taux brut 274,8*10 <sup>-5</sup> Hab (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
070	<i>Taux sanguin moyen de LDL cholestérol en population adulte</i>	P	ENNS	1,28 g/l (2006)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
070	<i>Taux sanguin moyen de cholestérol total en population adulte</i>	P	ENNS	2,08 g/l (2006)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques
070	<i>Hypercholestérolémies (LDL) (dont traitées équilibrées et non équilibrées)</i>	Cp	ENNS	18,9% des 18-74 ans >1,6g/L et 12,2% traités(2006)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies cardiovasculaires et métaboliques

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
070	Proportion d'adultes ayant eu une prescription d'hypolipémiant dans l'année	Cp	CNAMTS	15,1% assurés (2005)	15,5% remboursés (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
071	Pression artérielle systolique et diastolique moyenne mesurée en population adulte	P	ENNS	18-74 ans. PAS: Ensemble: 123,6mmHg, Hommes: 128,7mmHg, Femmes: 118,5mmHg; PAD: Ensemble: 77,8mmHg, Hommes: 79,3mmHg, Femmes: 76,2mmHg (2006)	ND	Mona Lisa	35-74 ans. PAS: Ensemble: ND, Hommes: 136,7mmHg, Femmes: 127,9mmHg; PAD: Ensemble: ND, Hommes: 83,2mmHg, Femmes: 78,6mmHg (2007)	ND	DREES (2008)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
071	Prévalence de l'hypertension artérielle (non traités/ traités (équilibrés/ non équilibrés))	Cp	ENNS	Prévalence: 31%. Traités: 82%, dont 50,9% équilibrés (2006)	ND	Mona Lisa	Hommes: 47,2%, Femmes: 34,9% (2007)	ND	DREES (2008)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
072	Taux d'incidence des accidents vasculaires cérébraux (AVC)	P	Registre des AVC (Dijon)	Tx standardisé: $99,1 \cdot 10^{-5}$ Hab (2000-2004)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
072	Nombre et taux de séjours hospitaliers en MCO pour accidents vasculaires cérébraux	P	PMSI	Séjours. Nombre: 121000, tx brut: $195,9 \cdot 10^{-5}$ Hab, tx standardisé: $108,7 \cdot 10^{-5}$ Hab; Personnes: ND (2003)	Séjours. Nombre: 99 165, tx brut: $156,5 \cdot 10^{-5}$ Hab, tx standardisé: $105,7 \cdot 10^{-5}$ Hab; Personnes: ND (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
072	Nombre de décès, taux brut et taux standardisé de mortalité par maladies cérébro-vasculaires (AVC)	Cp	Cépi-Dc	Nombre: 36701, tx stand: $36,7 \cdot 10^{-5}$ Hab population européenne (2002)	Nombre: 32 652, tx stand: $29,5 \cdot 10^{-5}$ Hab population européenne (2006)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
072	Fréquence et sévérité des séquelles fonctionnelles et des incapacités dans les suites d'un AVC	Cp	Registre des AVC (Dijon)	D'après le score de Rankin. Pas de séquelles: 37%, Handicap léger: 21%, Incapacité de marcher sans aide: 42% (2000-2004)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
073	Nombre et taux de séjours hospitaliers en court séjour pour insuffisance cardiaque	P	PMSI	Séjours. Nombre: 171100, tx brut: $274,9 \cdot 10^{-5}$ Hab, tx standardisé: $175,5 \cdot 10^{-5}$ Hab (2004)	Séjours. Nombre: 187 200, tx brut: $296,3 \cdot 10^{-5}$ Hab, tx standardisé: $182,2 \cdot 10^{-5}$ Hab (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
073	Nombre de décès, taux brut et taux standardisé de mortalité par insuffisance cardiaque	P	Cépi-Dc	Nombre: 20764, tx brut: 34,2*10 <sup>-5</sup> Hab, tx standardisé: 19,2*10 <sup>-5</sup> Hab (2004)	Nombre: 21 011, tx brut: 34,2*10 <sup>-5</sup> Hab, tx standardisé: 17,6*10 <sup>-5</sup> Hab (2006)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
080	Nombre de personnes nouvellement admises en ALD 19 (Code CIM10 N18.0)	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
080	Incidence estimée à partir du nombre de nouveaux patients pris en charge en dialyse et du nombre de patients ayant bénéficié d'une greffe préemptive	P	REIN	4 régions: nb 1293, tx standardisé: 128,2*10 <sup>-6</sup> Hab (2002)	16 régions: nb 7196, tx standardisé: 139*10 <sup>-6</sup> Hab (2007)	ND	ND	ND	DREES (2007), DREES (2006)	Maladies cardio-vasculaires et métaboliques
048	Incidence du cancer du col de l'utérus	P	FRANCIM (estimations)	Tx standardisé sur la population mondiale: 7,8*10 <sup>-5</sup> Hab (2000)	Tx standardisé sur la population mondiale: 7,1*10 <sup>-5</sup> Hab (2005)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Cancer
048	Taux de couverture du dépistage par frottis cervico-vaginal entre 25 et 65 ans	P	CNAMTS	53,6% (1998-2000)	57%(2004-2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Cancer
048	Proportion de tests HPV prescrits conformément aux recommandations de bonnes pratiques	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Cancer
048	Nombre annuel de frottis réalisés en médecine libérale chez les femmes de 25 à 65 ans	Cp	CNAMTS	4 546 924 (2003)	4706384 (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Cancer
048	Proportion de femmes de 25 à 65 ans déclarant avoir eu un frottis du col de l'utérus dans les trois années précédentes (date déclarée du dernier frottis)	Cp	Baromètre cancer	81% (2005)	ND	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Cancer
049	Proportion de patients enregistrés dans le cadre d'une réunion de concertation multidisciplinaire	P	Réseaux régionaux de cancérologie	277 416 comptes-rendus de RCP (2006)	465 564 dossiers de malades en RCP (2007)	ND	ND	ND	DRESS (2008)	Cancer
049	Survie relative à 5 ans (et à 10 ans) par type de cancer	P	FRANCIM (estimations)	à 5 ans: 50% ensemble des cancers	ND	ND	ND	ND	DRESS (2008)	Cancer
050	Stades au diagnostic pour le dépistage organisé	P	InVS	13,6% ca in situ, ca invasifs: ≤10mm: 37,0%; sans atteinte ganglionnaire: 74,7% (2003)	13,8% ca in situ, ca invasifs ≤10mm: 37,0%; sans atteinte ganglionnaire: 71,4% (2005)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Cancer
050	Taux de couverture du dépistage organisé ou spontané du cancer du sein	P	EGB CNAMTS	49,8% (2004-2005)	60,6% (2006-2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Cancer
050	Taux de participation au programme de dépistage organisé	Cp	InVS	40,2% (2004)	52,5% (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Cancer

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (°): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B <sup>(?)</sup>	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
050	Proportion de femmes de 50 à 74 ans déclarant avoir passé une mammographie de dépistage dans les deux années précédentes (dépistage organisé et spontané)	Cp	ESPS (IRDES)	70% (2002)	80% (2006)	Baromètre Santé	88% (2000)	96% (2005)	DREES (2009), DREES (2006)	Cancer
051	Proportion de mélanomes dépistés à un stade précoce (Indice de Breslow)	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Cancer
052	Pas d'indicateur défini									Cancer
053	Taux de participation au programme de dépistage organisé du cancer colorectal	P	INVS	42% (2006)	ND					Cancer
074	Nombre et taux d'hospitalisations annuels en MCO pour asthme	P	PMSI	Nombre: 51256; tx standardisé (pop française 1999): $8,7 \cdot 10^{-4}$ Hab (2002)	Nombre: 51680; tx standardisé (pop française 1999): $8,4 \cdot 10^{-4}$ Hab (2007)	ND	ND	ND	fiche de synthèse, DREES (2006), DREES (2006)	Maladies respiratoires
074	Proportion de patients hospitalisés plusieurs fois pour asthme parmi les personnes hospitalisées dans l'année pour asthme	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Maladies respiratoires
074	Proportion d'enfants hospitalisés pour asthme dans les 12 mois précédents parmi les élèves asthmatiques de grande section de maternelle, de CM2, de troisième	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Maladies respiratoires
074	Mortalité par asthme	Cp	Cépi-Dc	Hommes: $2 \cdot 10^{-5}$ Femmes: $1,8 \cdot 10^{-5}$ (2000)	Hommes: $1 \cdot 10^{-5}$ Femmes: $1 \cdot 10^{-5}$ (2006)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Maladies respiratoires
075	Pas d'indicateur défini		ND	ND	ND	ND	ND	ND		Maladies respiratoires
082	Taux de séjours hospitaliers pour fractures de l'extrémité supérieure du fémur chez les personnes de 65 ans et plus (taux bruts et standardisés sur la population européenne de 65 ans et plus)	P	PMSI	Taux brut: Femmes: $99,2 \cdot 10^{-4}$ Hab, Hommes: $39,8 \cdot 10^{-4}$ Hab; Tx standardisé (pop européenne): Femmes: $73,2 \cdot 10^{-4}$ Hab, Hommes: $39,0 \cdot 10^{-4}$ Hab (2003)	Taux brut: Femmes: $96,3 \cdot 10^{-4}$ Hab, Hommes: $41,0 \cdot 10^{-4}$ Hab; Tx standardisé (pop européenne): Femmes: $65,7 \cdot 10^{-4}$ Hab, Hommes: $36,9 \cdot 10^{-4}$ Hab (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Rhumatologie

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (?): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(?)</sup>	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
082	Taux d'incidence des fractures de l'extrémité supérieure du fémur ayant entraîné une hospitalisation chez les personnes de 65 ans et plus (taux bruts et standardisés sur la population européenne de 65 ans et plus)	Cp	PMSI	Taux brut: Femmes: 95,3*10 <sup>-4</sup> Hab, Hommes: 38,0*10 <sup>-4</sup> Hab; Tx standardisé (pop européenne): Femmes: 70,1*10 <sup>-4</sup> Hab, Hommes: 37,1*10 <sup>-4</sup> Hab (2003)	Taux brut: Femmes: 90,6*10 <sup>-4</sup> Hab, Hommes: 38,5*10 <sup>-4</sup> Hab;Tx standardisé (pop européenne): Femmes: 61,8*10 <sup>-4</sup> Hab, Hommes: 34,6*10 <sup>-4</sup> Hab (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Rhumatologie
082	Taux d'incidence des fractures de l'extrémité supérieure du fémur entraîné une hospitalisation chez les personnes âgées de 65 ans et plus vivant à domicile ou en institution	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
083	Limitations fonctionnelles des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
083	Restrictions d'activité des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
083	Nombre d'assurés sociaux de la CNAMTS atteints de polyarthrite rhumatoïde et mis en invalidité	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
083	Nombre (et taux) de patients nouvellement admis chaque année en ALD 22 pour polyarthrite rhumatoïde évolutive grave	Cp	CNAMTS	Nombre: ND; taux: 19-35*10 <sup>-5</sup> Hab (2006)	ND	ND	ND	ND	fiche de synthèse	Rhumatologie
084	Limitations fonctionnelles des personnes atteintes de spondylarthropathies	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
084	Restrictions d'activité des personnes atteintes de spondylarthropathies	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
084	Nombre d'assurés sociaux de la CNAMTS atteints de spondylarthropathies et mis en invalidité	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
084	Nombre (et taux) de patients nouvellement admis chaque année en ALD 27 pour spondylarthrite ankylosante grave	Cp	CNAMTS	Nombre: ND; taux: 6-22*10 <sup>-5</sup> Hab (2006)	ND	ND	ND	ND	fiche de synthèse	Rhumatologie
085	Proportion de patients souffrant d'arthrose périphérique et présentant des limitations de mobilité, des restrictions d'activité et/ou une dépendance (selon localisations)	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (?): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B <sup>(?)</sup>	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
085	Proportion de personnes ayant déclaré avoir de l'arthrose périphérique et déclarant une limitation durable d'activité (selon localisations)	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
085	Taux de séjours hospitaliers pour arthroplasties de hanche ou de genou	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
086	Proportion de patients souffrant de lombalgie et présentant des limitations de mobilité, des restrictions d'activité et/ou une dépendance (selon localisation)	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
086	Proportion de personnes ayant déclaré avoir des lombalgies et une limitation durable d'activité	Cp	HID	Hommes: 7,9%; Femmes: 7,5%. (1998-2002)	ND	ND	ND	ND	fiche de synthèse	Rhumatologie
086	Nombre de mises en invalidité pour lombalgie chronique	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
087	Score de qualité de vie (et sous scores—douleur) chez les patients atteints d'arthrose (selon localisation)	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
087	Complications des traitements médicamenteux de l'arthrose	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Rhumatologie
062	Incidence de l'épilepsie grave de l'enfant	Cp	Epi-VdM (INSERM)	Prévalence des épilepsies de l'enfant: 0,33%. Enfants en PAI: 4,35% des épileptiques. (2005-2006)	ND	ND	ND	ND	fiche de synthèse	Neurologie
062	Taux de patients ayant bénéficié de remboursements de traitement(s) spécifique(s) de l'épilepsie	Cp	RSI / Infocentre OCAPI	0,6% (2005)	0,62% (2006)	ND	ND	ND	fiche de synthèse	Neurologie
063	Score de perte d'autonomie chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Neurologie
063	Score de qualité de vie chez les proches de patients atteints de maladie d'Alzheimer	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Neurologie
064	Score de perte d'autonomie chez les patients atteints de maladie de Parkinson	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Neurologie
065	Limitations fonctionnelles des personnes atteintes de sclérose en plaque	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Neurologie
031	% de femmes ayant eu une anesthésie péridurale lors d'un accouchement	P	Enquête Nationale Périnatale (ENP)	Péridurale: 62,6%; Péridurale ou rachianesthésie: 74,2%. (2003)	ND	ND	ND	ND	DREES (2007)	Qualité de vie

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (?): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
031	% de personnes dont la douleur est prise en charge de façon efficace en post-opératoire	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Qualité de vie
031	% de personnes dont les douleurs par excès de nociception liées au cancer sont prises en charge de façon efficace	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Qualité de vie
031	Prévalence des enfants qui déclarent une douleur supérieure à 3/10 ou dont le score d'hétéro évaluation est supérieur à 30% du score maximum au décours de la réalisation de gestes diagnostiques ou thérapeutiques potentiellement douloureux.	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Qualité de vie
031	Prévalence des personnes déclarant avoir souffert d'une douleur physique difficile à supporter au cours des douze derniers mois ;	Cp	Baromètre santé	Une fois: 8,7%; Plus d'une fois: 20,1%. (2000)	ND	ND	ND	ND	DREES (2007), fiche de synthèse	Qualité de vie
031	Pourcentage de personnes déclarant que cette douleur a été prise en compte et soulagée rapidement par l'équipe soignante (douleurs à l'hôpital)	Cp	Baromètre santé	75,7% soulagées rapidement; 12,4% soulagées avec du retard. (2000)	ND	ND	ND	ND	DREES (2007), fiche de synthèse	Qualité de vie
031	Pourcentage de personnes satisfaites du traitement reçu parmi celles ayant consulté un médecin	Cp	Baromètre santé	81,7% (2000)	ND	ND	ND	ND	DREES (2007), fiche de synthèse	Qualité de vie
031	Consommation d'antalgiques en milieu ambulatoire	Cp	CNAMTS (MEDICAM)	260*106 boîtes remboursées. (2002)	342*10 <sup>6</sup> boîtes remboursées (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009)	Qualité de vie
032	Prévalence des personnes déclarant une douleur physique d'intensité modérée, grande ou très grande au cours des 4 dernières semaines	P	Enquête Santé (INSEE)	15 ans et plus: Femmes: 35%, Hommes: 25%; Ensemble: moins de 25 ans: 16%, 65-84ans: 50%, 85 ans et plus: 66%. (2002)	16 ans et plus: Femmes: 32%, Hommes: 24%; Ensemble: moins de 25 ans: 11%, 65-84ans: 50%, 85 ans et plus: 66%. (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009) DREES (2006)	Qualité de vie
032	Prévalence des personnes qui déclarent que leurs douleurs physiques les ont limitées moyennement, beaucoup ou énormément dans leur travail ou leurs activités domestiques	P	Enquête Santé (INSEE)	15 ans et plus: Femmes: 25%, Hommes: 18%; Ensemble: moins de 25 ans: 16%, 65-84ans: 50%, 85 ans et plus: 63%. (2002)	16 ans et plus: Femmes: 24%, Hommes: 18%; Ensemble: moins de 25 ans: 6%, 65-84ans: 42%, 85 ans et plus: 65%. (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009) DREES (2006)	Qualité de vie

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B (°)	Valeur B (°) (annee1)	Valeur B (°) (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
032	Prévalence de personnes déclarant souffrir fréquemment de douleurs importantes ou très importantes	P	ESPS (IRDES)	15-24 ans: Hommes: 2,3%, Femmes: 3,7%; 25-64 ans : Hommes: 14,2%, Femmes: 20,0%; 65 ans et plus: Hommes 24,5%, Femmes: 35,3%. (2000)	15-24 ans: Hommes: 2,2%, Femmes: 3,1%; 25-64 ans : Hommes: 12,0%, Femmes: 17,8%; 65 ans et plus: Hommes 29,9%, Femmes: 42,9%. (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009) DREES (2006)	Qualité de vie
035	Pas d'indicateur défini									Qualité de vie
076	Score de qualité de vie chez les patients atteints de MICI (Recto-colite hémorragique et maladie de Crohn)	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Qualité de vie
076	Pourcentage de patients hospitalisés et, le cas échéant, durée totale moyenne annuelle de séjour	Cp	PMSI	Nb de séjours pour MICI: 38400, avec stomie: 2,1%; Durée moyenne de séjour pour MICI: 5,3 jours, patients avec stomie: 25,4 jours. (2003)	Nb de séjours pour MICI: 46900, avec stomie: 2,4%; Durée moyenne de séjour pour MICI: 5,2 jours, patients avec stomie: 25,6 jours. (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Qualité de vie
076	Interventions chirurgicales mutilantes	Cp	PMSI	1% des personnes hospitalisées (2003)	0,9% des personnes hospitalisées (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Qualité de vie
076	Traitements des poussées inflammatoires	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Qualité de vie
076	Nombre (et taux) de patients nouvellement admis chaque année en ALD 24 pour rectocolite hémorragique ou maladie de Crohn évolutives	Cp	Données ALD des 3 régimes AM	Nombre: 84200; taux: ND (2004)	Nombre: 108000 en ALD dont 11000 nvx; taux: ND (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Qualité de vie
081	Score de qualité de vie des personnes atteintes d'IRCT sous dialyse	P	QV-REIN (SF-36)	Proportion de patients ayant une qualité de vie très altérée: score résumé physique: 30%; score résumé mental: 20% (2005)		QV-REIN (KDQoL)	Score moyen (/100) : Symptômes / problèmes: Femmes: 65,5-66,8, Hommes: 69,2-73,0; Effets de la maladie: Femmes: 48,8-55,4, Hommes: 51,5-57,4; Fardeau de la maladie: Femmes: 31,9-37,9, Hommes: 36,2-38,3. (2005-2006)	ND	DREES (2007)	Qualité de vie
081	Durée médiane d'attente avant greffe	Cp	REIN	13,4 mois; (1993-1995)	18,2 mois; (2002-2007)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Qualité de vie

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (°): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres



N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valuer B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
081	<i>Temps d'accès moyen au centre de dialyse</i>	Cp	REIN	Moyenne: 20min; Proportion de trajets >45min: 6,0-20,3% selon les régions. (2003)	Moyenne: 24min; Proportion de trajets >45min: 7,5%. (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Qualité de vie
088	<i>Distribution de l'âge au décès et létalité de la drépanocytose homozygote (ou hétérozygote composite)</i>	P	Cépi-Dc	Nombre: 711 décès liés, dont 418 en cause initiale distribution entre 1981-2005: 5%décès <1 an; 12,4% entre 1 et 4 ans; 7,5% entre 5 et 9 ans; 25% avant 10ans ; Âge moyen décès: 31 ans entre 2001-2005	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Rares
088	<i>Score de qualité de vie</i>	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Maladies Rares
088	<i>Nombre annuel moyen de jours d'hospitalisation pour les personnes atteintes de drépanocytose homozygote (ou hétérozygote composite)</i>	Cp	PMSI	8,8 jours d'hospitalisation/an (2006)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Rares
088	<i>Prévalence de la drépanocytose homozygote (ou hétérozygote composite)</i>	Cp	Données ALD CNAMTS et RSI	7271 personnes en ALD, dénominateur: ND (2006)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Rares
088	<i>Dépistage néonataux</i>	Cp	AFDPHE	242 nouveaux cas, France métró + 71 DOM (2003)	285 nouveaux cas, France métró + 90 DOM (2006)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Maladies Rares
090	<i>Pas d'indicateur défini</i>									Maladies Rares
057	<i>Nombre de malades psychotiques en situation de précarité suivis dans le système de soin</i>	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé mentale
057	<i>Nombre de malades psychotiques en situation de précarité non suivis dans le système de soin</i>	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé mentale
057	<i>Taux d'admission en ALD 23 (psychose et troubles graves de la personnalité)</i>	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé mentale
059	<i>Proportion de personnes ayant des troubles dépressifs sans recours aux soins parmi les personnes ayant des troubles dépressifs</i>	P	Baromètre Santé	12 derniers mois. Ensemble: 62% 66% hommes, femmes 61% (2005)	ND	Enquête Santé Mentale en Population Générale	2 dernières semaines. Ensemble: 40%; Hommes 47% femmes 36% (2003)	ND	DREES (2007)	Santé mentale

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
059	Proportion de personnes ayant des troubles anxieux sans recours aux soins parmi les personnes ayant des troubles anxieux	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé mentale
059	Proportion de personnes ayant des troubles bipolaires sans recours aux soins parmi les personnes ayant des troubles bipolaires	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé mentale
060	Pas d'indicateur défini									Santé mentale
061	Pas d'indicateur défini									Santé mentale
092	Taux de décès par suicide en population générale	P	Cépi-Dc	Selon sexe: Tx standardisé (âge): Hommes: 25,1*10 <sup>-5</sup> Hab; Femmes: 8,6*10 <sup>-5</sup> Hab. Selon l'âge: Tx brut: 15-24 ans: 7,6*10 <sup>-5</sup> Hab; Après 74 ans: 36,6*10 <sup>-5</sup> Hab. (2002)	Selon sexe: Tx standardisé (âge): Hommes: 23,6*10 <sup>-5</sup> Hab; Femmes: 8,0*10 <sup>-5</sup> Hab. Selon l'âge: Tx brut: 15-24 ans: 6,7*10 <sup>-5</sup> Hab; Après 74 ans: 33,7*10 <sup>-5</sup> Hab. (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé mentale
092	Fréquence relative des modes de suicide	P	Cépi-Dc	Pendaisons: 45%; Arme à feu: 16%; Médicaments: 15%; Saut d'un lieu élevé: 7% (2002)	Pendaisons: 46%; Arme à feu: 15%; Médicaments: 16%; Saut d'un lieu élevé: 8% (2005)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Santé mentale
078	Proportion de femmes déclarant l'existence de « pertes involontaires d'urines » durant depuis moins d'un an / plus d'un an	P	ESPS (IRDES)	Ensemble: 12,3%. Données sur la durée: ND (2006)	Ensemble: 12,7%. Données sur la durée: ND (2008)	INSERM	Incontinence d'effort: 26,8%; Incontinence avec impériosité: 6,8%; Incontinence mixte: 1,5% (2007)		DREES (2009), DREES (2006)	Personnes âgées
078	Proportion de femmes à qui une rééducation périnéale est prescrite après un accouchement.	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Personnes âgées
078	Proportion des femmes de plus de 50 ans à qui une rééducation périnéo-sphinctérienne est prescrite.	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Personnes âgées
099	Incidence annuelle des chutes ayant entraîné une hospitalisation chez les personnes âgées de 65 ans et plus	P	EPAC (InVS)	65 ans et plus. Chutes avec recours aux urgences. Ensemble: 4,8%; Hommes: 3,0%; Femmes: 5,9%. Une hospitalisation concerne 38% des épisodes. (2002)	65 ans et plus. Chutes avec recours aux urgences. Ensemble: 4,5%; Hommes: 3,0%; Femmes: 5,6%. Une hospitalisation concerne 37% des épisodes. (2004)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Personnes âgées

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
099	<i>Incidence annuelle des chutes déclarées chez les personnes âgées de 65 à 75 ans</i>	P	Baromètre Santé	23,8% des 65 ans et plus. Femmes: 27,6%; Hommes: 19,9%. (2005)	ND	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Personnes âgées
099	<i>Taux de mortalité par chutes chez les personnes âgées de 65 ans et plus</i>	Cp	Cépi-Dc	Tx standardisé (âge pop européenne). Ensemble: 36,6*10 <sup>-5</sup> Hab; Hommes: 45,2*10 <sup>-5</sup> Hab; Femmes: 31,4*10 <sup>-5</sup> Hab. (2002)	Tx standardisé (âge pop européenne). Ensemble: 44,2*10 <sup>-5</sup> Hab; Hommes: 45,5*10 <sup>-5</sup> Hab; Femmes: 43,2*10 <sup>-5</sup> Hab. (2004)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Personnes âgées
044	<i>Taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes</i>	P	Cépi-Dc	7,9*10 <sup>-5</sup> Naissances vivantes. (2001-2002)	6,4*10 <sup>-5</sup> Naissances vivantes. (2005-2006)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Santé de la reproduction
044	<i>Nombre et proportion de décès maternels jugés évitables</i>	Cp	INSERM U953 (Comité National d'experts sur la mortalité maternelle évitable).	54% (1996-2000)	49,1% (1999-2003)	ND	ND	ND	DREES (2008)	Santé de la reproduction
045	<i>Taux de mortalité périnatale</i>	P	INSEE	Métropole: 11,1*10 <sup>-3</sup> naissances (2004)	Métropole: 11*10 <sup>-3</sup> naissances (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé de la reproduction
045	<i>Taux de mortalité</i>	P	INSEE	Métropole: 8,9*10 <sup>-3</sup> ; DOM: 15,1*10 <sup>-3</sup> (2003)	Métropole: 9,3*10 <sup>-3</sup> (2007); DOM: 13,9*10 <sup>-3</sup> (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé de la reproduction
045	<i>Taux de mortalité néonatale</i>	P	INSEE	2,7*10 <sup>-3</sup> (2003)	2,5*10 <sup>-3</sup> (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé de la reproduction
045	<i>Taux de mortalité infantile</i>	Cp	INSEE	4,0*10 <sup>-3</sup> (2003)	3,8*10 <sup>-3</sup> (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé de la reproduction
046	<i>Nombre et taux d'incidence des grossesses extra-utérines</i>	P	PMSI	Nombre de séjours: 12670; Tx de GEU pour 100 naissances vivantes: 1,6% (2003)	Nombre de séjours: 12910; Tx de GEU pour 100 naissances vivantes: 1,6% (2007)	ND	ND	ND	DREES (2008), DREES (2006)	Santé de la reproduction

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(1)</sup>	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(1)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
047	Fréquence et distribution de la prématurité (< 28s, 28-30 s, 31-32 s, 33-34 s 35-36 s)	P	Enquête Nationale Périnatale (ENP)	Au global, 7,2% en comptant les mort-nés. Par rapport aux naissances vivantes, en métropole. 6,3% des naissances sont prématurées et se répartissent telles que: <28SA: 0,3%; 28-30SA: 0,4%; 31-32SA: 0,5%; 33-34SA: 1,2%; 35-36SA: 3,9% (2003)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Santé de la reproduction
047	Fréquence et distribution des petits poids de naissance (<1 000 g; 1000-1 499 g, 1500-2499 g)	P	Enquête Nationale Périnatale (ENP)	Par rapport aux naissances vivantes, en métropole. <1000g: 0,9%; 1000-1499g: 0,6%; 1500-2499g: 6,5% (2003)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Santé de la reproduction
047	Distribution des scores d'Apgar (< 7, < 4) à 5 mn	Cp	Enquête Nationale Périnatale (ENP)	Par rapport aux naissances vivantes, en métropole. <4: 0,2%; <7: 0,7% (2003)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Santé de la reproduction
047	Prévalence à 8 ans des infirmités motrices d'origine cérébrale; Prévalences des handicaps neurologiques, sensoriels et cognitifs d'origine périnatale	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de la reproduction
077	Disponibilité de données d'incidence et de prévalence;	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de la reproduction
077	Disponibilité d'une évaluation du retentissement sur la qualité de vie	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de la reproduction
077	Disponibilité de résultats permettant de déterminer un consensus sur les modalités de prise en charge	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de la reproduction
077	Description des pratiques de prise en charge, déterminants sociaux, déterminants liés à l'offre de soins	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de la reproduction
089	Fréquence des naissances d'enfants atteints d'une affection d'origine anténatale pour laquelle il n'y a pas eu d'évaluation préalable du risque	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de la reproduction
089	Ratio du nombre total d'amniocentèses (ou chorioncentèses) sur le nombre total de grossesses	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de la reproduction

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (1): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B (°)	Valeur B (°) (annee1)	Valeur B (°) (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
089	Ratio du nombre total d'IMG sur le nombre d'amniocentèses ou chorioncentèses	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de la reproduction
089	Degré de satisfaction des femmes à l'égard de la qualité de l'information reçue sur les différents dépistages des affections anténatales réalisés pendant la grossesse et notamment pour le dépistage de la trisomie 21	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de la reproduction
097	Fréquence et répartition des méthodes contraceptives utilisées et du recours à la contraception d'urgence (pilule du lendemain) par les femmes de 15 à 49 ans ayant des relations sexuelles et souhaitant éviter une grossesse	P	Baromètre Santé	Aucune méthode ou pas systématique: 4,6%. Parmi les utilisatrices: Pillule: 58,7%; Autre méthode hormonale: 1,3%; Stérilet: 24,2%; Préservatif masculin: 11,5%; Stérilisation tubaire: 2,0%; Implants, patchs, anneaux: 1,3%, Autres: 1,3%. (2005)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Santé de la reproduction
097	Taux d'incidence des IVG	P	DREES	14,6 p.1000 femmes (2004)	14,7 p.1000 femmes (2007)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Santé de la reproduction
097	Distribution des délais de prise de RV d'IVG	P	SAE	médiane: 10j; 1e quartile: 8j; 3e quartile: 15j (2003)	médiane: 10j; 1e quartile: 7j; 3e quartile: 15j (2005)	ND	ND	ND	DREES (2007), DREES (2006)	Santé de la reproduction
097	Ventes de contraceptifs utilisés en contraception d'urgence	Cp	GERS	811433 boîtes (2003)	1 209 223 boîtes (2008)	ND	ND	ND	DREES (2007)	Santé de la reproduction
097	Nombre d'unités de contraceptifs d'urgence délivrées dans les pharmacies et les établissements d'enseignement du second degré.	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de la reproduction
079	Incidence et prévalence des pathologies mammaires bénignes	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé des femmes
079	Retentissement des pathologies mammaires bénignes et de leur prise en charge sur la qualité de vie	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé des femmes
079	Suivi des pathologies mammaires bénignes en fonction de la catégorie sociale	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé des femmes
067	Pas d'indicateur défini									Santé de l'enfant

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (°): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(?)</sup>	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee1)	Valuer B <sup>(?)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>µ</sup>	Thème
091	Distribution des indices CAO mixte pour les enfants de 6 ans et CAO pour les enfants de 12 ans : moyenne, écart-type, médiane et quartiles; Proportion d'enfants indemnes de caries; Significant Caries Index (CAO ou CAO mixte moyen sur le 1/3 des enfants le	P	UFSBD	Enfants de 6 ans: CAO mixte: 3,73; Indemnes: 30% (1987); Enfants de 12 ans: CAO: 1,94; Indemnes: 40%; SCI: ND. (1998)	Enfants de 6 ans: CAO mixte: 1,38; Indemnes: 63,4%; Enfants de 12 ans: CAO: 1,23; Indemnes: 56%; SCI: ND. (2006)	ND	ND	ND	DREES (2007)	Santé de l'enfant
091	Proportion d'enfants ayant consulté au moins une fois un chirurgien dentiste au cours de l'année précédant et suivant leurs 6 ans.	Cp	CNAMTS et RSI	52,8% (2003-2005)	55,5% (2005-2007)	ND	ND	ND	fiche de synthèse	Santé de l'enfant
093	Taux de mortalité après accident de la vie courante chez les 0-14 ans, par cause	P	Cépi-Dc	Toutes causes: $2,8 \cdot 10^{-5}$ , RC (sexe masculin): 1,9. Par cause ( $\cdot 10^{-5}$ ): Noyade: 0,89; Suffocation: 0,58; Feu: 0,28; Chutes: 0,25; Intox: 0,07; Autres causes: 0,19; Cause non précisée: 0,5. (2002)	Toutes causes: $2,4 \cdot 10^{-5}$ , RC (sexe masculin): 2,0. Par cause ( $\cdot 10^{-5}$ ): Noyade: 0,7; Suffocation: 0,43; Feu: 0,34; Chutes: 0,27; Intox: 0,13; Autres causes: 0,13; Cause non précisée: 0,34. (2006)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2007)	Santé de l'enfant
095	Pas d'indicateur défini									Santé de l'enfant
096	Pourcentage d'enfants de 5-6 ans ayant bénéficié d'un dépistage des troubles du langage dans le cadre du bilan scolaire	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de l'enfant
096	Pourcentage d'enfants de 5-6 ans ayant été adressés à un professionnel en orthophonie (centre de référence, CMP ou orthophoniste indépendant) parmi les enfants ayant bénéficié d'un dépistage des troubles du langage dans le cadre du bilan scolaire	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de l'enfant
096	Nombre d'enfants dans la file active des centres de référence des troubles du langage et part d'enfants adressés par la médecine scolaire, la PMI et par les professionnels libéraux	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de l'enfant
096	Nombre et proportion d'enfants âgés d'environ 6 ans (fourchette d'âge de 5 à 7 ans) ayant bénéficié d'un bilan orthophonique	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de l'enfant

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (?) : Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

µ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A + (annee2)	Source B <sup>(?)</sup>	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
096	Nombre d'enfants orientés en CMPP pour des troubles du langage oral et écrit sur avis du médecin scolaire	Cp	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Santé de l'enfant
068	Prévalence des difficultés de vision de près sans lunettes, lentilles de contact ou autre appareillage spécifique déclarées	P	Enquête décennale Santé (INSEE)	49,5% (2002)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Atteintes sensorielles
068	Proportion de personnes qui déclarent avoir accès à un appareillage spécifique efficace parmi celles qui déclarent présenter des difficultés de vision de près	P	Enquête décennale Santé (INSEE)	Utilisation de correction parmi les symptomatiques: 96,2%. Efficacité: 92,4%. (2002)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Atteintes sensorielles
068	Prévalence des difficultés de vision de loin sans lunettes, lentilles de contact ou autre appareillage spécifique déclarées	P	Enquête décennale Santé (INSEE)	16,4% (2002)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Atteintes sensorielles
068	Proportion des personnes qui déclarent avoir accès à un appareillage spécifique efficace parmi celles qui déclarent présenter des difficultés de vision de loin	P	Enquête décennale Santé (INSEE)	Utilisation de correction parmi les symptomatiques: 96,8%. Efficacité: 90,10%. (2002)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Atteintes sensorielles
068	Prévalence des difficultés d'audition sans appareillage spécifique déclarées	P	Enquête décennale Santé (INSEE)	18 ans et plus: 11%; RC (H/F): 1,6. (2002)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Atteintes sensorielles
068	Proportion de personnes qui déclarent avoir accès à un appareillage efficace parmi celles qui déclarent présenter des troubles de l'audition	P	Enquête décennale Santé (INSEE)	Utilisation de correction parmi les symptomatiques: 19,4%. Efficacité: 56,6%. (2002)	ND	ND	ND	ND	DREES (2006)	Atteintes sensorielles
068	Prévalence des déficit auditifs (mesurés)	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Atteintes sensorielles
068	Prévalence des acouphènes	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Atteintes sensorielles
068	Incidence des traumatismes sonores	P	ND	ND	ND	ND	ND	ND		Atteintes sensorielles

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (?): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres

N° obj	Indicateurs*	Type**	Source A +	Valeur A + (annee1)	Valeur A+ (annee2)	Source B <sup>(?)</sup>	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee1)	Valeur B <sup>(?)</sup> (annee2)	Documents de référence <sup>μ</sup>	Thème
033	<i>Proportion de personnes qui ont renoncé à des soins dentaires ou optiques au cours des 12 derniers mois</i>	P	ESPS (IRDES)	18 ans et plus: 10%. Si présence d'une couverture complémentaire ou CMUc: 9,1%, si aucune couverture complémentaire: 20,3% (2004)	18 ans et plus: 11,6%. Si présence d'une couverture complémentaire ou CMUc: 11,1%, si aucune couverture complémentaire: 20,2% (2008)	ND	ND	ND	DREES (2009), DREES (2006)	Inégalités de santé
034	<i>Pas d'indicateur défini</i>									Inégalités de santé

\* : libellés selon propositions du groupe DGS-DREES juillet 2005

\*\* P: indic principal ; Cp: indic complémentaire

+ (?): Sources et données mesurées pour la période d'évaluation

μ : Rapports annuels DREES, fiches experts HCSP, autres