



CONTRE-INDICATIONS A LA VACCINATION

Les contre-indications à la vaccination sont élaborées en fonction des résumés des caractéristiques des produits des vaccins, ainsi qu'avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et la Haute Autorité de santé.

Les contre-indications des vaccins contre le Covid-19 sont inscrites à l'annexe du [décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022](#) relatif aux mesures de veille et de sécurité sanitaire maintenues en matière de lutte contre le Covid-19.

Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la covid-19 mentionnés à l'article 4

1. Les contre-indications inscrites dans les dernières versions des résumés des caractéristiques du produit (RCP) :

Contre-indications pour tous les vaccins autorisés en France :

- a. antécédent d'allergie documentée à un des composants du vaccin, produit actif ou excipients tels que mentionnés dans le RCP ;
- b. réaction anaphylactique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) secondaire à une injection d'un vaccin contre le Covid-19 confirmée par une après expertise allergologique ;

2. Une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) :

- a. myocardites ou myo-péricardites associées à une infection par SARS-CoV2 ;

3. Une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer une dose supplémentaire de vaccin (deuxième dose ou dose de rappel) suite à la survenue d'un effet indésirable d'intensité sévère ou grave attribué à une précédente injection de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré, de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique [PIMS]...) ;

4. Une recommandation établie par un centre de référence maladies rares (CRMR) ou un centre de compétence maladies rares (CCMR) après

concertation médicale pluridisciplinaire (avis collégial documenté) de ne pas initier la vaccination contre le Covid-19.

Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre le Covid-19 mentionnés à l'article 4

1. **Traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;**
2. **Myocardites ou péricardites d'étiologie non liée à une infection par SARS-CoV-2** survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives ;
3. **Syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS)** post-infection par le SARS-CoV-2, pendant 3 mois suivant la survenue du PIMS. La vaccination peut avoir lieu passé ce délai, après récupération d'une fonction cardiaque normale, et en l'absence de tout syndrome inflammatoire.